

安徽牯牛降发现短尾鸦雀

李永民^{①②} 薛 辉^① 吴孝兵^{①*} 顾长明^③ 陈文豪^④ 吴建中^⑤

① 安徽师范大学生命科学学院 芜湖 241000; ② 阜阳师范学院生命科学学院 阜阳 236037;
③ 安徽省自然保护管理站 合肥 230001; ④ 安徽省牯牛降国家级保护区石台保护站 石台 245100;
⑤ 安徽省牯牛降国家级保护区祁门保护站 祁门 245600

2012 年,作者在承担安徽省牯牛降国家级自然保护区综合考察期间,于 9 月 21 日在大历山脚下的新联村附近的竹林中(117°30′46.7″E, 30°06′28.1″N, 海拔 158 m)发现 28 只短尾鸦雀(*Paradoxornis davidianus*)结群在竹林中下层活动。该竹林位于农田旁边,附近有一条溪流穿过,周围山坡为亚热带常绿阔叶林。

作者对其行为进行了观察并拍摄到清晰照片。该鸟的主要识别特征为:体型小;尾羽较短,棕褐,羽缘棕色;头栗色;背部棕灰;翅羽灰褐,颈及喉黑,胸灰白,腹棕灰;虹膜褐色,喙粗厚、近粉色,脚近粉色;轻声的啾啾鸣叫。

短尾鸦雀为鹎科鸦雀属的鸟类,该物种的模式产地在福建西北部挂墩,俗名挂墩鸦雀。根据文献记载,短尾鸦雀在国外分布于中南半岛的北部,在国内目前仅见于福建武夷山、江西齐云山、浙江四明山、湖南莽山等局部地区。

根据《中国鸟类分类与分布名录》(郑光美 2011)和《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等 2000)以及其他相关资料,确认在牯牛降保护区发现的短尾鸦雀为安徽省雀形目鸟类新纪录。

短尾鸦雀为全球性易危种,数量稀少,分布区狭窄,在动物分布上被列为局部分布的典型代表。作为典型的森林生态系统类型的保护区,安徽省牯牛降国家级保护区环境质量良好,森林植被保存完整,此次短尾鸦雀在该区的发现,也是一个例证。

* 通讯作者, E-mail: wuxb@mail.ahnu.edu.cn。